

Les rendez-vous des Vaccins

Avril 2010

Prénom de l'enfant:

Date de naissance:

1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois
13 mois
14 mois
15 mois
16 mois
17 mois
18 mois



Merci aux femmes de la Maison de Quartier d'Helmet

Quels vaccins va recevoir votre enfant ?

à 2 mois

- Vaccin INFANRIX®
- Vaccin PRÉVENAR®
- Vaccin ROTAVIRUS

à 3 mois

- Vaccin INFANRIX®
- Vaccin ROTAVIRUS

à 4 mois

- Vaccin INFANRIX®
- Vaccin PRÉVENAR®
- Vaccin ROTAVIRUS

à 12 mois

- Vaccin PRÉVENAR®
- Vaccin RRO

à 15 mois

- Vaccin INFANRIX®
- Vaccin MÉNINGOCOQUE C

5-6 ANS :
le prochain rendez-vous vaccinal de votre enfant.

Avec 5 vaccins, vous protégez votre enfant contre 12 maladies

à 2 mois à 3 mois à 4 mois à 15 mois

Vaccin INFANRIX® (4 doses)
protège contre 6 maladies :



Diphtérie : infection de la gorge qui rend la respiration difficile.



Tétanos : maladie qui provoque la paralysie des muscles.



Coqueluche : quintes de toux qui sont particulièrement graves chez le petit bébé.



Haemophilus influenzae de type b : microbe qui peut provoquer une méningite.



Poliomyélite : maladie qui provoque des paralysies.



Hépatite B : inflammation du foie ; la maladie peut devenir chronique, et évoluer vers une cirrhose et parfois vers un cancer du foie.



18 mois

à 2 mois à 4 mois à 12 mois

Vaccin PRÉVENAR® (3 doses)
contre le pneumocoque :



Protège contre un microbe qui peut provoquer une pneumonie et parfois une méningite.



Vaccin RRO (Priorix®, 1 dose)
protège contre 3 maladies :



Rougeole : maladie qui provoque une forte fièvre, un état d'abattement important, des boutons rouges sur tout le corps, et qui peut se compliquer en otite, pneumonie ou encéphalite.



Rubéole : maladie qui s'accompagne de boutons sur tout le corps, surtout très dangereuse pour les femmes pendant le début de la grossesse car elle provoque des malformations du bébé.



Oreillons : maladie qui provoque un gonflement douloureux sous les oreilles. Elle entraîne souvent une méningite, parfois une surdité, plus rarement une stérilité.

à 15 mois

Vaccin contre le MÉNINGOCOQUE C (Menjugate®, 1 dose) :



Protège contre un microbe qui provoque une méningite.



À 18 mois, il faut faire compléter le certificat de vaccination contre la polio par un médecin.
Ce certificat doit être remis à la commune car cette vaccination est obligatoire.

COMMUNE

5-6 ANS : le prochain rendez-vous vaccinal de votre enfant.
Pour en savoir plus : www.sante.cfwb.be / www.one.be